

CATALOGUE DE VÉGÉTAUX



Programme d'aide à la végétalisation | 2026

Table des matières

Arbres	1
Bouleau à papier	2
Bouleau jaune	3
Cerisier à grappes	4
Chêne à gros fruits	5
Chêne rouge	6
Épinette blanche	7
Érable argenté	8
Érable à sucre	9
Érable de Pennsylvanie	10
Érable rouge	11
Mélèze laricin	12
Pin blanc	13
Sapin Baumier	14
Sorbier d'Amérique	15
Thuya occidental	16
Arbustes	17
Aronie noire	18
Aulne crispé	20
	20
Aulne rugueux	21
Chèvrefeuille involucre	22
Clématite de Virginie	23
Cornouiller stolonifère	24
Dierville chèvrefeuille	25
Framboisier rouge	26
Framboisier sauvage (ronce odorante)	27
Houx verticillé	28
Myrique baumier	29
Physocarpa à feuilles d'obier	30
Potentille frutescente	31


Rosier inerme	32
Rosier palustre	33
Saule de l'intérieur ou à feuilles étroites	34
Saule discolore	35
Spirée tomenteuse	36
Sumac vinaigrier	37
Sureau du Canada	38
Symphorine blanche	39
Vigne vierge	40
Viorne cassinoïde	41
Viorne lentago	42
Viorne trilobée	43
Herbacées	44
Ancolie du Canada	45
Asclépiade commune	46
Aster à feuilles cordées	47
Barbon de Gérard	48
Calamagrostide du Canada	49
Épilobe à feuilles étroites	50
Eupatoire maculée	51
Héliopsis faux-hélianthe	52
Immortelle d'argent ou immortelle blanche	53
Iris versicolore	54
Lis du Canada	55
Lobélie cardinale	56
Myosotis laxiflore	57
Physostégie de Virginie	58
Rudbeckie laciniée	59
Verveine hastée	60
Violette commune	61
Références	62
Pour nous joindre	62

ARBRES

BOULEAU À PAPIER

Betula papyriferaCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbre moyen
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Sableux à loameux. Préférence pour les sols acides. Intolérance au compactage.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Modérément profond
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons longs jaunes ou verts. Fruits : chatons pendants.
Commentaires	Rôle de la plante : écran solaire et brise-vent. Nourriture pour la faune. Bonne capacité de captation du phosphore dans le sol. Sensible à la pollution urbaine. Constituant important de la forêt boréale.



BOULEAU JAUNE


Betula alleghaniensis




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	3b
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols fertiles et profonds. Intolérance au compactage.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Modérément profond
Croissance	Moyenne à rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons longs et verdâtres. Fruits : chatons dressés, persistant quelques fois tout l'hiver.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire, brise-vent et protection contre l'érosion mineure des glaces. Arbre emblématique du Québec. Feuillu noble. Nourriture pour la faune. Écorce aromatique.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

CERISIER À GRAPPES


Prunus virginiana




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Petit arbre
Zone de rusticité	2
Type de sol	Argileuse, loameuse, sableuse ou organique
Humidité du sol	Sol sec, sol frais
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Intermédiaire
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : en grappe de fleurs blanches ; printanière Fruits : drupes rouges-pourpres; comestibles
Commentaires	Rôle de la plante : Intérêt pour les oiseaux et les papillons. Plante comestible

Position



Dimensions



Exposition



CHÊNE À GROS FRUITS


Quercus macrocarpa




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	2b
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols frais et profonds.
Humidité du sol	Moyenne
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Pivotant
Croissance	Lente
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons verdâtres. Fruits : glands à graines comestibles de 2 à 3 cm, verts en été devenant bruns à l'automne.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire, brise-vent et protection contre l'érosion mineure des glaces. Feuillu noble. Nourriture pour la faune. Tolère la pollution. Produit des noix comestibles.

Position



Dimensions



Exposition



Agiro

433, rue Delage

Québec (Québec) G3G 1H4

CHÊNE ROUGE


Quercus rubra




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	3a
Type de sol	Loameux à argileux. Préférence pour les sols non calcaires.
Humidité du sol	Moyenne. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Latéral et profond
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons jaunâtres. Fruits : glands brunâtres de 2 cm appréciés des écureuils ; mûrissement des fruits en 2 ans ; fruits sans intérêt pour l'homme (goût amer).
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire, brise-vent et protection contre l'érosion mineure des glaces. Feuillu noble. Nourriture pour la faune. Un des chênes dont la croissance est la plus rapide. Tolère les conditions urbaines.

Position



Dimensions



Exposition



Agiro

433, rue Delage

Québec (Québec) G3G 1H4

ÉPINETTE BLANCHE


Picea glauca




Crédit photo : <http://vegetaux.fihq.com> (1) et <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres> (2)

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	1a
Type de sol	Loameux à argileux
Humidité du sol	Élevée à moyenne. Préférence pour les sols frais et bien drainés.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : petits cônes verdâtres avec une teinte de rouge. Fruits : cônes pendants, cylindriques et oblongs, de 3,5 à 5 cm de longueur ; brun pâle ; appréciés des écureuils.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire et brise-vent. Excellent écran brise-vent. Nourriture pour la faune. Arbre ignoré des cerfs.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4


ÉRABLE ARGENTÉ

Acer saccharinum




Type	Grand arbre
Zone de rusticité	2b
Type de sol	Loameux à argileux
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel; racines envahissantes, puissantes et bien développées (ne pas planter près des drains ou de fosses septiques)
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : rougeâtres; au printemps, avant l'apparition des feuilles. Fruits : samares brunes apparaissant en abondance suite à la floraison.
Commentaires	Rôle de la plante : Feuillu noble. Écran solaire. Protection contre l'érosion mineure des glaces. Brise-vent. Stabilisation. Tolère les inondations périodiques, mais pas les sols détrempés. Tolère les sols compacts. Supporte la pollution.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage

Québec (Québec) G3G 1H4

ÉRABLE À SUCRE


Acer saccharum




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	4a
Type de sol	Loameux. Préférence pour sols fertiles et profonds. Intolérance au compactage.
Humidité du sol	Moyenne. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel à modérément profond
Croissance	Lente à moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : corymbes jaune verdâtre Fruits : disamares
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire, brise-vent et protection contre l'érosion mineure des glaces. Feuillu noble. Nourriture pour la faune. Sensible à divers polluants. Intérêt culinaire de sa sève : sirop d'érable.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

ÉRABLE DE PENNSYLVANIE


Acer pensylvanicum




Crédit photo : <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres>

Type	Petit arbre
Zone de rusticité	3a
Type de sol	Loameux. Préférence pour sols aérés et profonds.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Lente à moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : grappes retombantes jaune verdâtre. Fruits : grappes pendantes de disamares.
Commentaires	Rôle de la plante : écran solaire et protection contre l'érosion mineure des glaces. Aussi appelé « bois d'original » ou « bois barré ».

Position



Dimensions



Exposition



Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

ÉRABLE ROUGE


Acer rubrum




Crédit photo : <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	3a
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols acides. Tolère les sols compacts, mais éviter les sols calcaires.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne à rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : grappes de fleurs rouges avant la feuillaison. Fruits : disamars rougeâtres.
Commentaires	Rôle de la plante : écran solaire et protection contre l'érosion mineure des glaces. Feuillu noble. Nourriture pour la faune. Supporte mal l'élagage et la pollution. Feuilles devenant rouge vif à l'automne.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage

Québec (Québec) G3G 1H4

MÉLÈZE LARICIN


Larix laricina




Crédit photo : <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	1a
Type de sol	Sableux à argileux
Humidité du sol	Faible à élevée. Tolère les sols détrempés.
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide à moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : discrètes, sessiles et monoïques ; stigmates jaunes et pistil rosé ; les arbres portent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Fruits : cônes dressés et ovoïdes verts à violets devenant bruns.
Commentaires	Rôle de la plante : écran solaire et brise-vent. Nourriture pour la faune. Planter seulement dans les zones de faible pente. Sensible à la pollution urbaine.

Position



Dimensions



Exposition



Agro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

PIN BLANC


Pinus strobus




Crédit photo : <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	2b
Type de sol	Loameux. Préférence pour les sols acides et fertiles. Intolérance au compactage.
Humidité du sol	Moyenne à faible. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Latéral profond
Croissance	Moyenne à rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : sans intérêt ornemental ; fleurs mâles jaunes sur les branches basses et fleurs femelles roses et pourpres sur les hautes branches. Fruits : cônes pendants, effilés, cylindriques et résineux ; 8 à 20 cm de longueur ; persistant 1 an.
Commentaires	Rôle de la plante : écran solaire et brise-vent. Nourriture pour la faune. Arbre ignoré des cerfs. Éviter de planter près des groseilliers en raison du risque de maladie (rouille). Supporte mal les conditions urbaines.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

SAPIN BAUMIER


Abies balsamea




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbre
Zone de rusticité	1a
Type de sol	Loameux à graveleux. Préférence pour les sols acides. Tolère les sols compacts.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Lente
Fleurs/Fruits	Fleurs : sans intérêt ornemental ; les fleurs mâles sont rouge jaunâtre avec des reflets pourpres et les fleurs femelles sont jaunâtres et situées dans la cime de l'arbre. Fruits : cônes érigés et résineux ; 5 à 7 cm de longueur.
Commentaires	Rôle de la plante : écran solaire. Nourriture pour la faune. Peu adapté aux conditions urbaines.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4


SORBIER D'AMÉRIQUE

Sorbus americana


Crédit photo : <https://www.pepinieredeschenes.com> (1) et <https://aiglonindigo.com> (2 et 3)

Type	Petit arbre
Zone de rusticité	2
Type de sol	Loameux. Préférence pour les sols acides.
Humidité du sol	Moyenne
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne à lente
Fleurs/Fruits	Fleurs : corymbes de fleurs blanches de 5 à 10 cm de diamètre. Fruits : baies rouge orangé (sorbes) comestibles (après les gelées d'automne).
Commentaires	Rôle de la plante : écran solaire et protection contre l'érosion mineure des glaces. Nourriture pour la faune. Sensible à la brûlure bactérienne. Il est conseillé de tailler les branches atteintes.

Position



Dimensions



Exposition




THUYA OCCIDENTAL

Thuja occidentalis



Crédit photo : <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres> (1 et 2) et <https://aiglonindigo.com> (3)

Type	Arbre moyen
Zone de rusticité	2
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols profonds et calcaires. Tolère les sols compacts ou lourds.
Humidité du sol	Élevée à faible
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne à lente
Fleurs/Fruits	Fleurs : sans intérêt ornemental. Fruits : petits cônes dressés et persistants de 8 à 10 mm de longueur.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire et brise-vent. Nourriture pour la faune. À planter seulement dans les zones à faible pente.





ARBUSTES

AMÉLANCHIER DU CANADA

Amelanchier canadensis

Crédit photo : <http://vegetaux.fihq.com> (1) et <https://aiglonindigo.com> (2 et 3)

Type	Grand arbuste
Zone de rusticité	4a
Type de sol	Sableux à loameux. Préférence pour les sols acides. Intolérance au compactage.
Humidité du sol	Moyenne. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Moyenne
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : fleurs blanches hâtives apparaissant avant le feuillage ; avril-mai. Fruits : petites baies globuleuses rouges puis noires, sucrées, comestibles, se mangeant crues ou cuites ; mi-juin ; appréciées des oiseaux.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire et brise-vent. Nourriture pour la faune. Racines drageonnantes. Sensible à la pollution.

**Exposition**

Soleil



Mi-ombre



ARONIE NOIRE

Aronia melanocarpa



Crédit photo : <http://vegetaux.fihq.com> (1) et <https://aiglonindigo.com> (2 et 3)

Type	Arbuste
Zone de rusticité	4a
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols tourbeux et acide.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Lente
Fleurs/Fruits	Fleurs : corymbes blancs, parfois teintés de rose ; mai-juin. Fruits : petites baies noires appréciées des oiseaux ; comestible, mais goût amer et astringent ; il est donc préférable de consommer ce petit fruit transformé (jus, confitures, gelées, etc.).
Commentaires	Nourriture pour la faune. Meilleure fructification en plein soleil. Feuillage écarlate à l'automne. Racines drageonnantes.



AULNE CRISPÉ


Alnus viridis subsp. crispa




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	1a
Type de sol	Tous; tolère les sols acides, compacts et pauvres.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons d'avril à mai. Fruits : cocottes persistant tout l'hiver.
Commentaires	Plante fixatrice d'azote. Stabilisation

Position



Dimensions



Exposition




AULNE RUGUEUX


Alnus rugosaCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbuste
Zone de rusticité	1a
Type de sol	Graveleux ou loameux, Préférence pour les sols riches et légèrement acides. Tolère les sols pauvres.
Humidité du sol	Élevée. Tolère les conditions marécageuses.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons de couleur cuivrée ; avril-mai. Fruits : petits cônes bruns à maturité ; persistants l'hiver.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire et brise-vent. Nourriture pour la faune. Excellent pour la stabilisation des berges. Plante fixatrice d'azote.

Position



Dimensions



Exposition




CHÈVREFEUILLE INVOLUCRÉ


Lonicera involucrataCrédit photo : <https://www.aiglonindigo.com/produit/266/chevrefeuille-involucre>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	4b
Type de sol	Tout type de sol ; préférence pour les sols acides.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : jaunes ou orangées ; juin. Fruits : baies pourpres.
Commentaires	Plante médicinale. Attire les oiseaux. Résiste aux maladies et à la pollution.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre




Ombre

CLÉMATITE DE VIRGINIE

Clematis virginianaCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Plante grimpante ou rampante
Zone de rusticité	2
Type de sol	Loameux
Humidité du sol	Moyenne à élevée. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : petites fleurs blanches étoilées ; juillet-septembre. Fruits : petites sphères velues.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Nourriture pour la faune. Recommandée pour végétaliser les murets, les enrochements et les clôtures ; s'agrippe aux arbres et arbustes.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

CORNOUILLER STOLONIFÈRE


Cornus stolonifera




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Sableux à argileux. Tolère les sols compacts.
Humidité du sol	Faible à élevée.
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : groupées en cymes aplaties et blanches ; juin. Fruits : drupes globulaires blanchâtres ; appréciés des oiseaux.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Nourriture pour la faune. Plante excellente pour stabiliser les talus abrupts. Racines drageonnantes. Ignorée des cerfs.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre



Ombre

DIERVILLE CHÈVREFEUILLE


Diervilla lonicera




Crédit photo : <http://vegetaux.fihq.com> (1) et <https://aiglonindigo.com> (2 et 3).

Type	Petit arbuste
Zone de rusticité	3a
Type de sol	Graveleux ou sableux. Préférence pour les sols légèrement acides.
Humidité du sol	Faible à moyenne. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : cymes jaune clair devenant plus foncées et fleurissant sur le bois de l'année ; juin. Fruits : capsules brun-rouge.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Nourriture pour la faune. Plante drageonnante, mais non envahissante. Résiste à la pollution.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil




Mi-ombre

FRAMBOISIER ROUGE


Rubus idaeusCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Loameux ou sableux. Préférence pour les sols organiques.
Humidité du sol	Faible à moyenne. Préférence pour les sols bien drainés. Tolère la sécheresse.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : verdâtres ; juin. Fruits : framboises rouges comestibles.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Nourriture pour la faune. Tiges épineuses. Racines drageonnantes. Taille de recépage au besoin.

Position



Dimensions



Exposition




FRAMBOISIER SAUVAGE (RONCE ODORANTE)

Rubus odoratus




Type	Arbuste
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux
Humidité du sol	Moyenne à élevée. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : fleurs roses odorantes à cinq pétales ; juin-août. Fruits : fruits rouges tout l'été ; comestibles.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Sans épines. À privilégier en sous-bois rocailleux. Plante appréciée des oiseaux et des papillons. Tolérance moyenne au compactage. Racines drageonnantes.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre



Ombre

HOUX VERTICILLÉ


Ilex verticillata




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com> (1 et 2) et <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres> (3).

Type	Arbuste
Zone de rusticité	3b
Type de sol	Loameux. Préférence pour les sols acides. Tolère les sols lourds.
Humidité du sol	Élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne à lente
Fleurs/Fruits	Fleurs : petites fleurs blanches ; mai-juin. Fruits : drupes globuleuses, rouges et persistantes l'hiver ; appréciées des oiseaux ; fructification sur les individus femelles uniquement.
Commentaires	Nourriture pour la faune. Ne supporte pas le recépage. Non flexible.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil




Mi-ombre

MYRIQUE BAUMIER


Myrica galeCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Petit arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Loameux. Préférence pour les sols acides et tourbeux. Tolère les sols pauvres.
Humidité du sol	Élevée. Tolère les sols détrempés.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : mâles : petits chatons brunâtres dressés solitaires, femelles : brunâtres et semblables à un cône ; mai-juin Fruits : secs à pointes résineuses ; jaunâtres ; persistants l'hiver.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Contrôle l'érosion. Racines drageonnantes. Excellent sur le bord de l'eau. Parfum camphré issu des gouttelettes résineuses sur les tiges et le feuillage.

Position



Dimensions



Exposition



PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER


Physocarpus opulifolius




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	2b
Type de sol	Sableux à argileux. Tolère les sols compacts.
Humidité du sol	Faible à élevée. Tolère les conditions de sécheresse, mais ne tolère pas les sols détrempés.
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : corymbes ombelliformes blancs tachetés de rose ; mai-juin. Fruits : capsules membraneuses et rougeâtres à la fin de l'automne ; appréciés des oiseaux ; persistants une partie de l'hiver.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation et brise-vent. Plante appréciée des oiseaux.

Position



Dimensions



Exposition



POTENTILLE FRUTESCENTE


Potentilla fruticosa




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Petit arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols fertiles.
Humidité du sol	Moyenne. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : jaune vif ; juin-juillet. Fruits : akènes, sans intérêt.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Plante ignorée des cerfs. Nourriture pour la faune.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

ROSIER INERME


Rosa blanda



Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Sableux à argileux. Tolère les sols lourds.
Humidité du sol	Faible à moyenne. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : simples, rose pâle et odorantes ; juin-août. Fruits : rouges foncés, comestibles (infusion, desserts, yogourt, gelée, compote, sorbet, etc.) et persistants.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Relativement peu d'épines. Bonne résistance aux insectes et aux maladies. Plante drageonnante. Nourriture pour la faune.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

ROSIER PALUSTRE


Rosa palustris



Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	4
Type de sol	Loameux à argileux
Humidité du sol	Élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : simples, roses et odorantes ; mai-juin. Fruits : rouges vifs, comestibles et persistants.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Tiges très épineuses. Bonne résistance aux insectes et aux maladies. Plante drageonnante. Nourriture pour la faune. Pousse directement dans les marais, les étangs et les rives de lacs et de rivières.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre




Ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4


SAULE DE L'INTÉRIEUR OU À FEUILLES ÉTROITES

Salix interior



Crédit photo : <https://aiglonindigo.com> (1 et 2) et <https://www.saulesquebec.com> (3)

Type	Arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols lourds.
Humidité du sol	Moyenne à élevée. Préférence pour les sols humides.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons en groupe de fleurs apparaissant longtemps avant les feuilles ; attirent les papillons. Fruits : capsules glabres.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation et écran solaire. Contrôle l'érosion du sol. Flexible. Tolère les inondations temporaires. Plante allergène. Nourriture pour la faune.




SAULE DISCOLORE


Salix discolor

Type	Arbuste
Zone de rusticité	2
Type de sol	Tous types. Préférence pour les sols lourds et humides
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : chatons apparaissant avant les feuilles au début du mois d'avril. Fruits : capsules lisses à pointe allongée brun rougeâtre.
Commentaires	Rôle de la plante : contrôle de l'érosion et stabilisation du sol. Peut subir une immersion prolongée.

Position



Dimensions



Exposition




SPIRÉE TOMENTEUSE


Spiraea tomentosaCrédit photo : <https://pepiniererustique.ca> (1) et <https://aiglonindigo.com> (2).

Type	Arbuste
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux et loameux. Préférence pour les sols loameux.
Humidité du sol	Faible à moyenne. Préférence pour les sols humides.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : panicules érigées violacées ; juillet-août. Fruits : couverts d'un duvet
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Espèce pionnière. Nourriture pour la faune. Plante ignorée des cerfs. Racines drageonnantes. Intérêt culinaire de ses feuilles : infusion. Aussi appelé « thé du Canada ».

Position



Dimensions



Exposition



Soleil





Mi-ombre

SUMAC VINAIGRIER

Rhus typhinaCrédit photo : <https://aiglonindigo.com> (1 et 2) et <http://vegetaux.fihq.com> (3)

Type	Grand arbuste
Zone de rusticité	3a
Type de sol	Sableux à argileux.
Humidité du sol	Faible. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne à rapide.
Fleurs/Fruits	Fleurs : petites, jaune verdâtre en panicules ; juin-juillet. Fruits : petites drupes poilues rouges réunies en panicules ; très décoratifs à la fin de l'été, persistantes sur les plants femelles durant l'hiver et appréciées des oiseaux.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire et brise-vent. Plante appropriée pour les grands espaces. Non flexible. Racines drageonnantes. Nourriture pour la faune. Intérêt culinaire de ses fruits : jus, infusion.


**Exposition**

SUREAU DU CANADA


Sambucus canadensisCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux à argileux.
Humidité du sol	Faible à élevée. Préférence pour les sols humides.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : blanches, parfumées, en forme d'étoiles, réunies en corymbes ; juin. Fruits : baies noires en grappes ; comestibles (lorsque mûres).
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Racines drageonnantes. Nourriture pour la faune. Plante ignorée des cerfs. Propriétés médicinales. Intérêt culinaire : jus, confitures, tarte, gelée, sirop, etc.

Position



Dimensions



Exposition




SYMPHORINE BLANCHE

Symphoricarpos albus


Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Sableux à argileux. Tolère les sols pauvres.
Humidité du sol	Faible à élevée
Tolérance aux sels	Oui
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : petites fleurs roses ; juin-septembre. Fruits : baies blanches décoratives attirant les oiseaux et légèrement toxiques (indigestion et irritation de la peau).
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Nourriture pour la faune. Résiste aux cerfs. Tolère la pollution. Racines drageonnantes.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre



Ombre


VIGNE VIERGE

Parthenocissus quinquefolia

Crédit photo : <https://aiglonindigo.com> (1 et 2) et <http://vegetaux.fihq.com> (3)

Type	Plante grimpante ou rampante
Zone de rusticité	2
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols légèrement acides.
Humidité du sol	Moyenne. Préférence pour les sols secs.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : verdâtres ; floraison estivale. Fruits : raisins bleus appréciés des oiseaux, mais toxiques pour l'humain.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation et écran solaire. Contrôle l'érosion. Nourriture pour la faune. Tolère les conditions venteuses et la pollution. Belle coloration rouge du feuillage à l'automne.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre



Ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4


VIORNE CASSINOÏDE

Viburnum cassinoides




Type	Arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Tous; préférence pour les sols organiques
Humidité du sol	Faible à élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Lente
Fleurs/Fruits	Fleurs : petites fleurs blanc crème formant une cyme composée au printemps. Fruits : drupes rouges qui deviennent bleu foncé; comestibles.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation écran brise-vent. Feuillage prenant une teinte rouge orangé à pourpre à l'automne. Plante ignorée des cerfs. Tolère les sols pauvres.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre



Ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

VIORNE LENTAGO


Viburnum lentago




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Sableux à argileux.
Humidité du sol	Faible à élevée, Tolère autant les sols humides que secs.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : blanches en cymes aplaties ; juin. Fruits : drupes rouges qui deviennent noires bleutées ; comestibles.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire et brise-vent. Racines drageonnantes. Supporte la pollution. Nourriture pour la faune.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre



Ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

VIORNE TRILOBÉE


Viburnum trilobum




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Grand arbuste
Zone de rusticité	2a
Type de sol	Loameux. Tolère les sols pauvres.
Humidité du sol	Moyenne. Préférence pour les sols humides et bien drainés.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : cymes aplaties blanches ; juin. Fruits : rouges, demeurant en place pendant l'hiver ; comestibles (goût rappelant la figue et le bleuet), appréciés des oiseaux et mammifères.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation et brise-vent. Non flexible. Feuillage devenant rouge à l'automne. Nourriture pour la faune. Arbuste ignoré des cerfs. Intérêt culinaire de ses fruits : jus, gelée, confiture.

Position



Dimensions



Exposition



Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

HERBACÉES

ANCOLIE DU CANADA


Aquilegia canadensis




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Préférence pour les sol sablonneux ou graveleux, mais s'adapte facilement à différents milieux.
Humidité du sol	Sol sec, frais, bien drainé.
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	N/D
Fleurs/Fruits	Fleurs : rouge et jaune ; mai-juin.
Commentaires	Plante d'intérêt pour les papillons et les oiseaux (source de nectars pour les colibris). Plante médicinale. Résiste aux cerfs.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

ASCLÉPIADE COMMUNE


Asclepias syriaca




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com> (1), <https://pepiniererustique.ca> (2).

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sol pauvre, voire sablonneux ou rocailleux.
Humidité du sol	Sec ou très bien drainé
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : ombelles de fleurs roses; juillet-août.
Commentaires	Plante odorante et nectarifère attirant les monarques. Comestible. Se reproduit par rhizomes et se ressème.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

ASTER À FEUILLES CORDÉES


Symphyotrichum cordifolium (syn. *Aster cordifolius*)




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Tout type de sol (préfère sols rocailleux)
Humidité du sol	Faible à moyenne (préfère sols bien drainés)
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : petites fleurs en étoiles blanches et feuillage en forme de cœur. Très large et abondant; juillet à octobre.
Commentaires	Rôle de la plante : tapis végétal dense qui empêche la germination des mauvaises herbes. Plante très appréciée des pollinisateurs et des abeilles.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

BARBON DE GÉRARD


Andropogon gerardii




Crédit photo : <https://akene.ca/products/semences-barbon-de-gerard-andropogon-gerardii>

Type	Graminée
Zone de rusticité	4
Type de sol	Tout type de sol. Préférence pour les sols bien drainés. Résistance à la sécheresse et chaleur.
Humidité du sol	Moyenne à élevée.
Tolérance aux sels	Modéré
Enracinement	Abondant et profond
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : épis pourpre prenant une coloration rougeâtre pendant l'automne ; juillet à octobre
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation Nourriture et habitat pour la faune

Position



Dimensions



Exposition



CALAMAGROSTIDE DU CANADA


Calamagrostis canadensis




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Graminée
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux à argileux
Humidité du sol	Élevée à moyenne. Préférence pour les sols détrempés ou inondés de façon saisonnière ou temporaire.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et profond
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : épis dorés prenant une coloration rougeâtre pendant l'été ; juillet-août.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation et écran solaire. Graminée ornementale d'une résistance exceptionnelle. Nourriture pour la faune.

Position



Dimensions



Exposition



ÉPILOBE À FEUILLES ÉTROITES


Epilobium angustifolium



Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	2
Type de sol	Tout type de sol. Préférence pour les sols frais et organiques.
Humidité du sol	Faible
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : grappes allongées roses à pourpres au sommet de la tige ; juillet-août.
Commentaires	Plante décorative se propageant par stolon. Idéale pour former de grandes populations à l'effet spectaculaire. Intérêt culinaire de ses feuilles et de ses fruits : infusion, salade, aromatisation de viandes et de plats, décoration culinaire.

Position




Dimensions



Exposition




EUPATOIRE MACULÉE

Eutrochium maculatumCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Loameux. Préférence pour les sols lourds, fertiles et calcaires.
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et modérément profond
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : capitule rose pourpre, cylindrique, en corymbe plus ou moins aplati et dense; juillet à septembre.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation et écran solaire.
	Favorise les pollinisateurs.
	Nourriture pour les papillons.
	Plante médicinale. À planter en massif.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

HÉLIOPSIS FAUX-HÉLIANTHE


Heliopsis helianthoides



Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux à loameux
Humidité du sol	Faible à moyenne. Préférence pour sols bien drainés et résistance à la sécheresse.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et modérément profond
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : capitules jaunes à disque central jaune brun ; juillet-août.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Vivace ressemblant au tournesol, mais dont la floraison précède celle des véritables tournesols.

Position



Dimensions



Exposition



IMMORTELLE D'ARGENT OU IMMORTELLE BLANCHE


Anaphalis margaritacea




Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	2
Type de sol	Sablonneux et rocailleux. Tolérant au sol pauvre
Humidité du sol	Sol sec
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fruits/Fleurs	Fleurs : Blanche; août à octobre.
Commentaires	Rôle de la plante : Attire les pollinisateurs.

Position



Dimensions



Exposition




IRIS VERSICOLERE

Iris versicolorCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux à argileux
Humidité du sol	Élevée à très élevée
Tolérance aux sels	Modérée
Enracinement	Superficiel
Croissance	Rapide
Fruits/Fleurs	Fleurs : fleurs terminales bleu violacé ; juin-juillet.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Emblème floral du Québec.
	Dès que la touffe de fleurs fleurit moins ou que les fleurs diminuent de taille, divisez les souches (environ tous les 3-4 ans).
	Nourriture pour la faune. Plante ignorée des cerfs.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro


433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

LIS DU CANADA

Lilium canadenseCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	4
Type de sol	Loameux, sableux
Humidité du sol	Sol frais, sol humide
Tolérance aux sels	-
Enracinement	-
Croissance	-
Fruits/Fleurs	Fleurs : 1 à 16 grande fleur penchée porté par de long pédoncule, couleur jaune-orangé avec des taches brunes à l'intérieur; juin-juillet.
Commentaires	Espèce vulnérable au Québec Milieux de prédilection : les marécages et les marais, les aulnaies, les forêts humides, les milieux ouverts semi-ombragés et humides ainsi que les grèves estuariennes

Position



Dimensions



Exposition



Soleil




Mi-ombre

LOBÉLIE CARDINALE

Lobelia cardinalisCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Loameux. Préférence pour les sols fertiles.
Humidité du sol	Élevée à moyenne
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et modérément profond
Croissance	Moyenne
Fleurs/Fruits	Fleurs : grappe de fleurs tubulaires rouge écarlate ; juillet-septembre.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation et écran solaire. Nourriture pour la faune. Les colibris raffolent de cette plante. Attire les papillons. Résiste aux limaces. Plante de rivage en eau calme. Se resseme.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil




Mi-ombre

MYOSOTIS LAXIFLORE

Myosotis laxaCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux à argileux. Préférence pour les sols fertiles.
Humidité du sol	Élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et modérément profond
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : petites fleurs bleu ciel à cinq pétales ; juin-juillet.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation.
	Couvre-sol. Seul myosotis indigène au Québec.

Position



Dimensions



Exposition



PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE


Physostegia virginiana



Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux à argileux
Humidité du sol	Moyenne à élevée. Préférence pour les sols bien drainés.
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et modérément profond
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : fleurs tubulaires en épis de couleur mauve ; juillet-septembre.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Nourriture pour la faune. Favorise les pollinisateurs. Nourrit les papillons. Se combine très bien à la verveine hastée et se prête bien à une utilisation en massif.

Position



Dimensions



Exposition



Soleil




Mi-ombre

Agiro

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

RUDBECKIE LACINIÉE


Rudbeckia lacianata



Crédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Tous ; Frais et Humide
Acidité du sol	Légèrement acide à neutre
Humidité du sol	Moyenne à élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et profond
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : capitules jaune or à centre conique verdâtre; juillet à septembre.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation, écran solaire. Plante médicinale. Nourrit les oiseaux et les papillons. Plante ignorée des cerfs. Plante compétitive

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre

Agiro


433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

VERVEINE HASTÉE

Verbana hastataCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	3
Type de sol	Sableux à argileux
Humidité du sol	Élevée
Tolérance aux sels	Non
Enracinement	Abondant et profond
Croissance	Rapide
Fleurs/Fruits	Fleurs : multitude de fleurs bleues sur de longs épis qui chapeautent le plant ; juillet-septembre.
Commentaires	Rôle de la plante : stabilisation. Bisannuelle qui se ressème. Planter en massif dense. Intérêt culinaire : est utilisée pour faire des tisanes.

Position



Dimensions



Exposition



Agiro


 433, rue Delage
 Québec (Québec) G3G 1H4

VIOLETTE COMMUNE


Viola seroniaCrédit photo : <https://aiglonindigo.com>

Type	Vivace
Zone de rusticité	2
Type de sol	Argileux, loameux, sableux
Humidité du sol	Sol frais
Tolérance aux sels	-
Enracinement	-
Croissance	-
Fleurs/Fruits	Fleurs : violet; mai-juin
Commentaires	Plante couvre sol, convient aux rocailles. Résiste au cerf. Plante comestible

Position



Dimensions



Exposition



Soleil



Mi-ombre



Ombre

RÉFÉRENCES

Aiglon Indigo. Site internet consulté le 27 mars 2019. <https://aiglonindigo.com>

Bureau d'études sur la Permaculture Design. Site internet consulté le 1^{er} avril 2019. <https://www.permaculturedesign.fr>

Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. Outil de recherche de plantes recommandées pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec. Site internet consulté le 27 mars 2019. <http://vegetaux.fihq.com>

Groww. Site internet consulté le 1^{er} avril 2019. <https://www.groww.fr/fr>

Hydro-Québec. Unité Environnement. Direction – Expertise et support à la réalisation des travaux (2010) Répertoire des arbres et arbustes ornementaux. Quatrième édition. Hydro-Québec Distribution.

Multiplants. Site internet consulté le 1^{er} avril 2019. <http://quebecmultiplants.com>

Pépinière Casse-Noisette. Site internet consulté le 29 mars 2019. <http://www.cassenoisettepepiniere.com>

Pépinière Deschênes. Site internet consulté le 28 mars 2019. <https://www.pepinieredeschenes.com>

Pépinière Rustique. Site internet consulté le 9 mai 2019. <https://pepiniererustique.ca>

Répertoire Québec Nature. Site internet consulté le 29 mars 2019. <http://repertoirequebecnature.com>

Ressources naturelles Canada. Forêts – Arbres, insectes et maladies des forêts du Canada. Site internet consulté le 27 mars 2019. <https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres>

Underwood Crockett, James (1979) L'encyclopédie time-life du jardinage – Arbres et arbustes. Seconde impression française. Éditions Time Life.

POUR NOUS JOINDRE

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

418 849-9844
info@agiro.org
agiro.org